

2-1

有向角及其度量




重點

有向角及角的度量

1. 有向角：

平面上以 O 點為軸心，將一射線 $\overrightarrow{OA}$ 旋轉至 $\overrightarrow{OB}$ 的位置形成 $\angle AOB$ ，稱為有向角。其中 $\overrightarrow{OA}$ 稱為始邊， $\overrightarrow{OB}$ 稱為終邊， O 點稱為頂點。而依逆時針方向旋轉的角為正角，依順時針方向旋轉的角為負角。



2. 角的度量：


(1) 六十分制：將圓周 360 等分，每一等分所對之圓心角為 1 度。

1 度 = 60 分，1 分 = 60 秒。記為 $1^\circ = 60'$ ， $1' = 60''$ 。

(2) 弧度制：一圓之弧長等於半徑時，則定義此弧所對應的圓心角為 1 弧度（徑）。

(3) 六十分制與弧度制的換算：




$$360^\circ = 2\pi \text{ (徑)} \Rightarrow \begin{cases} 1^\circ = \frac{\pi}{180} \text{ (徑)} \\ 1 \text{ (徑)} = \frac{180^\circ}{\pi} \end{cases}$$



3. 標準位置角：

(1) 坐標平面上，將有向角的頂點與原點重合，始邊位於 x 軸正向，則此角稱為有向角的標準位置角。

(2) 標準位置角終邊落在第 n 象限，則稱為第 n 象限角（ $n=1, 2, 3, 4$ ）。終邊落在 x 軸或 y 軸上則稱為象限角。



4. 同界角：

(1) 兩標準位置角具有相同的始邊和終邊，則稱此兩有向角為同界角。

(2) θ_1 和 θ_2 為同界角 $\Leftrightarrow \theta_1 - \theta_2 = 360^\circ \cdot n$ 或 $2\pi \cdot n$ (n 為整數)。

(3) $\theta = 360^\circ \cdot n + \phi$ (n 為整數, $0^\circ < \phi < 360^\circ$)，則 ϕ 稱為 θ 的最小正同界角 (同界角中最小的正角)。而 $\phi - 360^\circ$ 稱為 θ 的最大負同界角 (同界角中最大的負角)。

 **NOTE** 若以弧度制表示 $\theta = 2\pi \cdot n + \phi$ (n 為整數, $0 < \phi < 2\pi$)，則 ϕ 稱為 θ 的最小正同界角，而 $\phi - 2\pi$ 稱為 θ 的最大負同界角。

難易度 🐾

01 老師講解

角度單位換算

學生演練 

(1) $120^\circ =$ _____ 弧。

(2) $\frac{2\pi}{3} =$ _____ 度。

(3) $3 =$ _____ 度。

(1) $225^\circ =$ _____ 弧。

(2) $\frac{3\pi}{2} =$ _____ 度。

(3) $-10^\circ =$ _____ 弧。

難易度 🐾

02 老師講解

同界角

學生演練 

試求下列各角之最小正同界角與最大負同界角

(1) 1300° (2) -920° (3) $\frac{15\pi}{4}$ 。

試求下列各角之最小正同界角與最大負同界角

(1) 950° (2) -1000° (3) $-\frac{20\pi}{6}$ 。



重點

扇形的弧長和面積

1. 扇形：

扇形圖形為圓的一部份，其大小由半徑 r 和圓心角 θ 所決定。

2. 弧長 s ：


$$\frac{s}{2\pi r} = \frac{\theta}{2\pi} \Rightarrow s = r \cdot \theta \quad (\text{其中 } \theta \text{ 為弧度制})。$$

3. 面積 A ：

$$\frac{A}{\pi r^2} = \frac{\theta}{2\pi} \Rightarrow A = \frac{1}{2} r^2 \theta = \frac{1}{2} r \cdot s \quad (\text{其中 } \theta \text{ 為弧度制})。$$

4. 周長：

$$\text{扇形周長} = s + 2r。$$



難易度

03 老師講解

扇形的弧長和面積

學生演練



已知扇形弧長 6π 公分，圓心角 120° ，試求扇形半徑及面積。

已知扇形半徑為 4 公分，面積為 8π 平方公分，試求圓心角 θ 及弧長。

難易度


04 老師講解

弧長及面積應用


學生演練



試求右圖陰影部分面積。



試求右圖陰影部分面積。





自我挑戰



1. 標準位置角 $\frac{-25\pi}{6}$ 為第 _____ 象限角。
2. (1) $\pi^\circ =$ _____ 度。 (2) $\frac{2}{\pi} =$ _____ 度。
3. -480° 的最小正同界角為 _____。
4. 若 $\frac{-17\pi}{3}$ 的最小正同界角為 α ，最大負同界角為 β ，則 $\alpha + \beta =$ _____。
5. 某扇形半徑為 4，角度為 θ ，其面積為 π 。若另一扇形半徑為 1，角度為 θ ，則其弧長為 _____。
6. 美式賣場賣披薩共有直徑 9 吋和 12 吋兩款，小閔兩款披薩各買一個，且二種尺寸各切一片。已知先切下第一片圓心角 $\frac{\pi}{3}$ 的 9 吋披薩，若想讓第二片披薩的大小也一樣，則 12 吋披薩必須切下圓心角為 _____。

2-2

銳角的三角函數




重點 銳角的三角函數

定義：直角三角形 ABC 中 $\angle C$ 為 90° ， $\angle A$ 、 $\angle B$ 、 $\angle C$ 對邊長分別為 a 、 b 、 c 。如圖（一）， $\angle A = \theta$ ，則定義 θ 的六個三角函數值

(對稱成倒數)

$$\begin{aligned} &\text{正弦 } \sin \theta = \frac{a}{c} \left(\frac{\text{對邊}}{\text{斜邊}} \right) \\ &\text{餘弦 } \cos \theta = \frac{b}{c} \left(\frac{\text{鄰邊}}{\text{斜邊}} \right) \\ &\text{正切 } \tan \theta = \frac{a}{b} \left(\frac{\text{對邊}}{\text{鄰邊}} \right) \\ &\text{餘切 } \cot \theta = \frac{b}{a} \left(\frac{\text{鄰邊}}{\text{對邊}} \right) \\ &\text{正割 } \sec \theta = \frac{c}{b} \left(\frac{\text{斜邊}}{\text{鄰邊}} \right) \\ &\text{餘割 } \csc \theta = \frac{c}{a} \left(\frac{\text{斜邊}}{\text{對邊}} \right) \end{aligned}$$



NOTE 銳角三角函數可視為一直角三角形中兩邊長的比值。只需熟記前三個，其餘由上而下按順序對稱成倒數。

難易度

01 老師講解

銳角三角函數

學生演練



已知直角 $\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ 、 $\overline{AB} = 15$ ，
且 $\cos A = \frac{3}{5}$ ，試求

(1) $\sin A$ (2) $\tan B$ (3) 周長。

已知直角 $\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ 、 $\overline{BC} = 10$ ，
且 $\tan A = \frac{5}{12}$ ，試求




(1) $\sin A$ (2) $\tan B$ (3) 周長。



重點 特別角的三角函數值

30° 、 60° 、 45° 的三角函數值：由 $30^\circ-60^\circ-90^\circ$ 及 $45^\circ-45^\circ-90^\circ$ 等特殊三角形的邊長比例可得以下銳角特別角的三角函數值。

三角函數 \ θ	$\theta = 30^\circ$	$\theta = 60^\circ$	$\theta = 45^\circ$
$\sin \theta$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$
$\cos \theta$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$
$\tan \theta$	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	$\sqrt{3}$	1
$\cot \theta$	$\sqrt{3}$	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1
$\sec \theta$	$\frac{2}{\sqrt{3}}$	2	$\sqrt{2}$
$\csc \theta$	2	$\frac{2}{\sqrt{3}}$	$\sqrt{2}$



NOTE 三角函數的次方標示在正上方，例： $\sin^2 30^\circ = (\sin 30^\circ)^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$ 。

難易度

02 老師講解

特別角的三角函數

學生演練

試求下列各式之值：

(1) $\sin^2 45^\circ \sec^2 45^\circ + \tan^2 60^\circ - \cos 60^\circ \csc 30^\circ$ 。

(2) $\cos \frac{\pi}{3} + \tan^2 \frac{\pi}{6} - \sin^2 \frac{\pi}{4} - \sec^2 \frac{\pi}{6}$ 。

試求下列各式之值：

(1) $\sin 30^\circ \sec^2 45^\circ - \cot^2 30^\circ + \cos^2 30^\circ \csc^2 30^\circ$ 。

(2) $\cot^2 \frac{\pi}{4} + \tan^2 \frac{\pi}{3} - \sin \frac{\pi}{6} + \sec \frac{\pi}{3} - \cos \frac{\pi}{3}$ 。



自我挑戰



1. $\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $\sin A = \frac{12}{13}$, 若 $\overline{AC} = 10$ 公分, 則 $\triangle ABC$ 之面積為 _____ 平方公分。
2. 求 $3\cos\frac{\pi}{3} \times \csc^2\frac{\pi}{4} - \sin\frac{\pi}{4}\cos\frac{\pi}{4} - \cos\frac{\pi}{6}\cot\frac{\pi}{3}$ 之值為 _____。
3. 已知 α 、 β 為直角三角形 $\triangle ABC$ 之兩銳角, 且 $\cos\alpha = \frac{2}{3}$, 則 $\tan\beta =$ _____。

2-3

三角函數的基本性質




重點 三角函數的恆等關係

1. 平方關係：
$$\begin{cases} \sin^2\theta + \cos^2\theta = 1 \\ \tan^2\theta + 1 = \sec^2\theta \\ 1 + \cot^2\theta = \csc^2\theta \end{cases}$$



NOTE 可由圖(二)著色部分三角形方便記誦。




$$\Rightarrow \text{上}^2 + \text{上}^2 = \text{下}^2$$

2. 倒數關係：
$$\begin{cases} \sin\theta \cdot \csc\theta = 1 \\ \tan\theta \cdot \cot\theta = 1 \\ \cos\theta \cdot \sec\theta = 1 \end{cases}$$



NOTE 可由圖(二)對角線方便記誦。




$$\Rightarrow \text{對角相乘} = 1 \quad (a \times b = 1)$$


3. 商數關係：
$$\begin{cases} \tan\theta \cos\theta = \sin\theta \Rightarrow \frac{\sin\theta}{\cos\theta} = \tan\theta \\ \cot\theta \sin\theta = \cos\theta \Rightarrow \frac{\cos\theta}{\sin\theta} = \cot\theta \end{cases}$$



NOTE 可由圖(二)連續的三頂點方便記誦, 任意的連續三點均有商數關係, 在此僅列出最常用的二組。



$$\Rightarrow \text{外} \times \text{外} = \text{內} \quad (x \times z = y)$$



圖(二)

4. 餘角關係：

$$\begin{cases} (1) \sin \theta = \cos(90^\circ - \theta), \cos \theta = \sin(90^\circ - \theta) \\ (2) \tan \theta = \cot(90^\circ - \theta), \cot \theta = \tan(90^\circ - \theta) \\ (3) \sec \theta = \csc(90^\circ - \theta), \csc \theta = \sec(90^\circ - \theta) \end{cases}$$

 **NOTE** 圖（二）中左邊為正函數（正弦、正切、正割），右邊為餘函數（餘弦、餘切、餘割），角度 θ 的正函數值等於餘角（ $90^\circ - \theta$ ）的餘函數值，反之亦同。

難易度 **01 老師講解****平方關係**學生演練 

試求 $3\sin^2 10^\circ - 2\tan^2 35^\circ + 3\cos^2 10^\circ + 2\sec^2 35^\circ$ 之值。

試求 $2\sin^2 10^\circ + 2\sin^2 80^\circ + 3\tan^2 10^\circ - 3\csc^2 80^\circ$ 之值。

難易度 **02 老師講解****倒數關係**學生演練 

化簡 $\frac{1}{1+\sin \theta} + \frac{1}{1+\cos \theta} + \frac{1}{1+\sec \theta} + \frac{1}{1+\csc \theta}$ 。

化簡 $\frac{2}{1+\sin \theta} + \frac{3}{1+\cos \theta} + \frac{3}{1+\sec \theta} + \frac{2}{1+\csc \theta}$ 。

難易度 🐾🐾

03 老師講解

商數關係

學生演練



已知 $\tan \theta = \frac{2}{3}$ ，試求 $\frac{3 \sin \theta + 2 \cos \theta}{2 \sin \theta - 3 \cos \theta}$ 。

已知 $\cot \theta = \frac{3}{4}$ ，試求 $\frac{3 \sin \theta + 2 \cos \theta}{2 \sin \theta - 3 \cos \theta}$ 。



重點

 $\sin \theta \pm \cos \theta$ 題型整理

1. 已知 $\sin \theta \pm \cos \theta \xrightarrow{\text{平方關係}} \rightarrow$ 可求得 $\sin \theta \cos \theta$ 。

已知 $\sin \theta \cos \theta \xrightarrow{\text{平方關係}} \rightarrow$ 可求得 $\sin \theta \pm \cos \theta$

NOTE $(\sin \theta \pm \cos \theta)^2 = \sin^2 \theta + \cos^2 \theta \pm 2 \sin \theta \cos \theta = 1 \pm 2 \sin \theta \cos \theta$

2. 商數及平方關係應用：

$$\tan \theta + \cot \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} + \frac{\cos \theta}{\sin \theta} = \frac{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta}{\sin \theta \cos \theta} = \frac{1}{\sin \theta \cos \theta}$$

3. 倒數關係應用：

$$\sec \theta \pm \csc \theta = \frac{1}{\cos \theta} \pm \frac{1}{\sin \theta} = \frac{\sin \theta \pm \cos \theta}{\sin \theta \cos \theta}$$

4. (1) 立方和公式：

$$a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)。$$

(2) 立方差公式：

$$a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)。$$



NOTE ① $\sin^3 \theta + \cos^3 \theta = (\sin \theta + \cos \theta)(\sin^2 \theta - \sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta)$
 $= (\sin \theta + \cos \theta)(1 - \sin \theta \cos \theta)。$

② $\sin^3 \theta - \cos^3 \theta = (\sin \theta - \cos \theta)(\sin^2 \theta + \sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta)$
 $= (\sin \theta - \cos \theta)(1 + \sin \theta \cos \theta)。$

③ 遇高次方： $\sin^4 \theta$ 可視為 $(\sin^2 \theta)^2$ ， $\sin^6 \theta$ 可視為 $(\sin^2 \theta)^3$ 再代入化簡。

難易度 🐾🐾

04 老師講解

 $\sin \theta \pm \cos \theta$ 題型

學生演練



若 θ 為銳角， $\sin \theta - \cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ，試求下列各式

之值：

(1) $\sin \theta \cos \theta$ (2) $\tan \theta + \cot \theta$ 。

若 θ 為銳角， $\sin \theta + \cos \theta = \frac{4}{3}$ ，試求下列各式

之值：

(1) $\sin \theta \cos \theta$ (2) $\tan \theta + \cot \theta$ 。

難易度 🐾🐾

05 老師講解

根與係數關係應用

學生演練



已知 $\sin \theta$ 及 $\cos \theta$ 為 $3x^2 - 2x + k = 0$ 之兩根，試求 k 。

已知 $\sin \theta$ 及 $\cos \theta$ 為 $2x^2 + x + k = 0$ 之兩根，試求 k 值。



自我挑戰



1. 試求 $(\sin 20^\circ - \csc 20^\circ)^2 + (\cos 20^\circ - \sec 20^\circ)^2 - (\tan 20^\circ)^2 - (\cot 20^\circ)^2 =$ _____。

2. 化簡 $\frac{1}{1-\sin \theta} + \frac{1}{1-\cos \theta} + \frac{1}{1-\sec \theta} + \frac{1}{1-\csc \theta} =$ _____。

3. 若 $\tan \theta = \frac{2}{3}$ ，則 $\frac{6 \sin \theta + 4 \cos \theta}{3 \sin \theta + 5 \cos \theta} =$ _____。

4. 設 θ 為實數，若 $\sin \theta + \cos \theta = \frac{1}{3}$ ，則 $\tan \theta + \cot \theta =$ _____。
5. 若 $\sin \theta + \cos \theta = \sqrt{2}$ ，則 $\sec \theta + \csc \theta$ 的值為 _____。
6. 已知 θ 為銳角，且 $\sin \theta > \cos \theta$ 。若 $\sin \theta + \cos \theta = \frac{\sqrt{17}}{3}$ ，則 $\sin \theta - \cos \theta$ 的值為 _____。
7. 試求 $2\sec^2 20^\circ - 2\cot^2 70^\circ + \sin 50^\circ \sec 40^\circ$ 之值為 _____。
8. 若 θ 為銳角， $\sin \theta - \cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ，試求下列各式之值：
- (1) $\sec \theta - \csc \theta =$ _____ (2) $\sin \theta + \cos \theta =$ _____。

2-4

任意角的三角函數




重點

任意角三角函數的定義


1. 任意角三角函數：

設 $P(x, y)$ 為標準位置角 θ 終邊上任意一點，且 $\overline{OP} = r$ ，其中 $r = \sqrt{x^2 + y^2} > 0$ ，如圖（三），則定義此任意角 θ 的三角函數，如下：

$$\begin{cases} \sin \theta = \frac{y}{r} \\ \cos \theta = \frac{x}{r} \\ \tan \theta = \frac{y}{x} \\ \cot \theta = \frac{x}{y} \\ \sec \theta = \frac{r}{x} \\ \csc \theta = \frac{r}{y} \end{cases}$$



圖（三）



圖（四）



NOTE θ 為第一象限角時，如圖（四），可視為銳角三角函數。

但 θ 為二、三、四象限角時， x 、 y 值有可能為負數，所以三角函數值亦可能小於 0，此為任意角三角函數與銳角三角函數最大的差異。

2. 各象限三角函數值正負判定：

(1)

三角函數 \ 象限	一 (+,+)	二 (-,+)	三 (-,-)	四 (+,-)
$\sin \theta = \frac{y}{r}$	$\frac{+}{+} \Rightarrow +$	$\frac{+}{+} \Rightarrow +$	$\frac{-}{+} \Rightarrow -$	$\frac{-}{+} \Rightarrow -$
$\cos \theta = \frac{x}{r}$	$\frac{+}{+} \Rightarrow +$	$\frac{-}{+} \Rightarrow -$	$\frac{-}{+} \Rightarrow -$	$\frac{+}{+} \Rightarrow +$
$\tan \theta = \frac{y}{x}$	$\frac{+}{+} \Rightarrow +$	$\frac{+}{-} \Rightarrow -$	$\frac{-}{-} \Rightarrow +$	$\frac{-}{+} \Rightarrow -$


NOTE

1. $r = \sqrt{x^2 + y^2} > 0$

$$2. \begin{cases} \csc \theta = \frac{r}{y} \text{ 正負與 } \sin \theta \text{ 相同} \\ \sec \theta = \frac{r}{x} \text{ 正負與 } \cos \theta \text{ 相同} \\ \cot \theta = \frac{x}{y} \text{ 正負與 } \tan \theta \text{ 相同} \end{cases}$$

(2) 以上結論歸納整理如右，可用「才」字方便記誦。

(3) 本書提供以銳角三角函數的解題概念（畫直角三角形）解題，請熟記三角函數於各象限之正負判定。



難易度

01

老師講解

任意角三角函數

學生演練



若點 $P(-3,4)$ 在標準位置角 θ 的終邊上，試求 $\sin \theta + \cos \theta + \tan \theta$ 。

若點 $P(\sqrt{3}, -1)$ 在標準位置角 θ 的終邊上，試求 $\sin \theta + \cos \theta + \cot \theta$ 。

難易度 🐾🐾

02 老師講解

三角函數正負判定

學生演練



已知坐標平面上點 $P(\sin \theta, \cos \theta)$ 在第二象限，試求：

- (1) θ 為第幾象限角。
- (2) 點 $Q(\tan \theta, \sec \theta)$ 在第幾象限。

已知坐標平面上點 $P(\tan \theta, \cos \theta)$ 在第三象限，試求：

- (1) θ 為第幾象限角。
- (2) 點 $Q(\sin \theta, \cot \theta)$ 在第幾象限。

難易度 🐾🐾

03 老師講解

任意角三角函數求值

學生演練



已知 $\tan \theta = -\frac{1}{\sqrt{3}}$ ，且 $\sin \theta > 0$ ，試求 $\sin \theta + \cos \theta$ 。

已知 $\cos \theta = \frac{4}{5}$ ，且 $\tan \theta < 0$ ，試求 $\sin \theta + \tan \theta$ 。




重點

象限角的三角函數

象限角三角函數值求法：

- (1) 象限角終邊在 x 軸或 y 軸上，無法畫出直角三角形，所以只能由定義求值。
 (2) 可令 $r=1$ ，則單位圓與 x 、 y 軸交於四點 $(1,0)$ 、 $(0,1)$ 、 $(-1,0)$ 、 $(0,-1)$ 分別對應為 $\theta=0^\circ$ 、 90° 、 180° 、 270° 終邊上的一點坐標，如圖（五），再由定義可得以下三角函數值。

$r=1, \theta$ 三角函數	$0^\circ(1,0)$	$90^\circ(0,1)$	$180^\circ(-1,0)$	$270^\circ(0,-1)$
$\sin \theta = \frac{y}{r}$	0	1	0	-1
$\cos \theta = \frac{x}{r}$	1	0	-1	0
$\tan \theta = \frac{y}{x}$	0	無意義	0	無意義
$\cot \theta = \frac{x}{y}$	無意義	0	無意義	0
$\sec \theta = \frac{r}{x}$	1	無意義	-1	無意義
$\csc \theta = \frac{r}{y}$	無意義	1	無意義	-1



圖（五）

難易度

04

老師講解

象限角的三角函數值

學生演練



試求 $\sin 270^\circ + \cos 180^\circ + \tan 0^\circ + \csc 90^\circ$ 。

試求 $\sin 90^\circ + \cos 0^\circ + \tan 180^\circ + \csc 270^\circ$ 。




重點

任意角化為銳角的三角函數

1. 負角公式：

- (1) $\sin(-\theta) = -\sin \theta$ (4) $\cot(-\theta) = -\cot \theta$ 。
 (2) $\cos(-\theta) = \cos \theta$ (5) $\sec(-\theta) = \sec \theta$ 。
 (3) $\tan(-\theta) = -\tan \theta$ (6) $\csc(-\theta) = -\csc \theta$ 。



圖（六）


NOTE 由圖(六)得知標準位置角 θ 與 $-\theta$ 之終邊上一點 $P(x, y)$ 與 $P'(x, -y)$ 之 y 坐標異號， x 坐標相同，所以三角函數中僅 $\cos \theta = \frac{x}{r} = \cos(-\theta)$ 和 $\sec \theta = \frac{r}{x} = \sec(-\theta)$

其正負角函數值相同。


2. 將任意角 ϕ ($0^\circ < \phi < 360^\circ$) 之三角函數值化為銳角 ($0^\circ < \theta < 90^\circ$) 三角函數值之步驟：

- (1) 確定任意角 ϕ 終邊之象限。
- (2) 找出任意角 ϕ 與 x 軸所夾之銳角 θ 。
- (3) $F(\phi) = \pm F(\theta)$ ，其中 F 表任一三角函數，「 $\pm$ 」號由該函數與 ϕ 角終邊所在之象限決定。


例如 $\sin 120^\circ = +\sin 60^\circ$ 、 $\sin 210^\circ = -\sin 30^\circ$ 、 $\cos 315^\circ = +\cos 45^\circ$ 、 $\tan 150^\circ = -\tan 30^\circ$ 。




第二象限 $\sin$ 為 +



第三象限 $\sin$ 為 -



第四象限 $\cos$ 為 +



第二象限 $\tan$ 為 -

難易度 🐾🐾

05

老師講解

任意角化為銳角

學生演練



試求下列各式之值：

- (1) $\sin 330^\circ$ (2) $\cos 510^\circ$
 (3) $\sec(-210^\circ)$ (4) $\tan(-300^\circ)$ 。

試求下列各式之值：

- (1) $\cos 120^\circ$ (2) $\sin 930^\circ$
 (3) $\csc(-480^\circ)$ (4) $\cot(-405^\circ)$ 。



若 $\sin 590^\circ = k$ ，試以 k 表示 $\tan 860^\circ$ 。

若 $\tan 490^\circ = k$ ，試以 k 表示 $\cos 580^\circ$ 。



自我挑戰



1. 設 θ 終邊上一點 P 的坐標為 $(x, -1)$ ，且 $\cot \theta = 2$ ，則 $\cos \theta =$ _____。
2. 若點 $A(\cos \theta, \tan \theta)$ 在第四象限內，則 θ 為第 _____ 象限角。
3. 若 $\cot \theta = \frac{3}{4}$ ，且 $\sin \theta < 0$ ，則 $\frac{\sin \theta}{1 - \cot \theta} + \frac{\cos \theta}{1 - \tan \theta} =$ _____。
4. 求 $\sin 1200^\circ \times \cot(-480^\circ) + \cos(-240^\circ) \times \tan 495^\circ$ 之值為 _____。
5. 設 $0^\circ < \theta < 360^\circ$ ，若 $\cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ，則 $\theta =$ _____。
6. 若 $\cos 140^\circ = k$ ，則 $\tan 2020^\circ =$ _____。
7. 設 θ 為銳角，則 $\frac{\cos(-\theta)}{\sin(360^\circ + \theta)} + \frac{\tan(180^\circ + \theta)}{\tan(360^\circ - \theta)} - \frac{\sin(270^\circ - \theta)}{\cos(90^\circ + \theta)} =$ _____。

2-5

三角函數的圖形與週期



重點


三角函數的圖形和週期

1. 週期函數：

若 $F(x)$ 為週期函數且週期為 P ，則 $F(nP+x)=F(x)$ ，其中 n 為整數。

2. 三角函數之圖形、週期、值域和定義域：

函數	圖形	定義域	值域	週期
$y = \sin x$		$x \in \mathbb{R}$	$-1 \leq \sin x \leq 1$	2π
$y = \cos x$		$x \in \mathbb{R}$	$-1 \leq \cos x \leq 1$	2π
$y = \tan x$		$x \neq n\pi + \frac{1}{2}\pi$ $n \in \mathbb{Z}$	$\tan x \in \mathbb{R}$	π
$y = \cot x$		$x \neq n\pi$ $n \in \mathbb{Z}$	$\cot x \in \mathbb{R}$	π
$y = \sec x$		$x \neq n\pi + \frac{1}{2}\pi$ $n \in \mathbb{Z}$	$\sec x \geq 1$ 或 $\sec x \leq -1$	2π

$y = \csc x$		$x \neq n\pi$ $n \in \mathbb{Z}$	$\csc x \geq 1$ 或 $\csc x \leq -1$	2π
--------------	---	-------------------------------------	---------------------------------------	--------

NOTE ① $|\sin x|$, $|\cos x|$, $|\sec x|$, $|\csc x|$ 之週期為原函數週期 $\frac{1}{2}$ 倍。

② $|\tan x|$, $|\cot x|$ 之週期與原函數週期相同。

3. 週期與係數：

原函數 $F(x)$ 之週期為 P ，則 $aF(kx+b)+c$ 之函數圖形其

- (1) 週期 = $\frac{P}{|k|}$ 。
- (2) 振幅變成原來的 $|a|$ 倍。
- (3) 圖形向上平移 c 單位。
- (4) 圖形向左平移 $\frac{b}{|k|}$ 單位。

NOTE ① 週期僅受自變數 x 之係數 k 影響，與 a 、 b 、 c 無關。


② 以 $y = 2\sin(3x + \pi) + 1$ 為例，其週期為 $\frac{2\pi}{3}$ ，振幅為原來 2 倍，圖形向上平移 1 單位，向左平移 $\frac{\pi}{3}$ 單位。

4. 三角函數值比較大小：


(1) 同角度不同函數：

可化為銳角再由直角三角形邊長判定：

① $\theta < 45^\circ$



② $\theta > 45^\circ$



(2) 同函數不同角度：

可由圖形特徵判定：

- ① $\sin x$ 、 $\cos x$ 這兩個函數圖形一定要會畫。
- ② $\tan x$ 圖形在同象限內恆為遞增函數，角度愈大函數值就愈大。
- ③ $\cot x$ ， $\sec x$ ， $\csc x$ 分別為 $\tan x$ ， $\cos x$ ， $\sin x$ 之倒數，其大小會與之相反。

難易度 🐾🐾



01 老師講解

三角函數圖形

學生演練

畫圖求下列函數之週期和最大、最小值

$$y = 3\sin 2x + 1。$$

畫圖求下列函數之週期和最大、最小值

$$y = 3\cos \frac{x}{2} - 1。$$

難易度 🐾



02 老師講解

三角函數週期

學生演練

試求下列三角函數之週期

$$(1) y = 2\sin \frac{x}{2} - 3$$

$$(2) y = 4\tan 2x + 1$$

$$(3) y = 3|\sec 2x|$$

$$(4) y = |\cot 3x| + 2。$$

求下列三角函數之週期

$$(1) y = \cos \frac{x}{3} + 2$$

$$(2) y = -2\cot \frac{x}{3} + 1$$

$$(3) y = 2|\sin 3x| - 1$$

$$(4) y = |\tan 2x|。$$

難易度 🐾🐾



03 老師講解

方程式求三角函數值

學生演練

若 $3\sin^2 \theta - 5\cos \theta - 1 = 0$ ，試求 $\cos \theta$ 。

若 $2\tan^2 \theta - 3\sec \theta = 0$ ，試求 $\sec \theta$ 。

難易度 🐾🐾



04 老師講解

三角函數比較大小

學生演練

比較下列各值大小

(1) $a = \sin 400^\circ$ 、 $b = \cos(-40^\circ)$ 、

$c = \cot 220^\circ$ 、 $d = \sec 50^\circ$ ，

試比較 a 、 b 、 c 、 d 大小。

(2) $a = \sin 20^\circ$ 、 $b = \cos 50^\circ$ 、 $c = \sin 35^\circ$ 、

$d = \tan 50^\circ$ ，試比較 a 、 b 、 c 、 d 大小。

比較下列各值大小

(1) $a = \sin 130^\circ$ 、 $b = \cos 310^\circ$ 、

$c = \tan 230^\circ$ 、 $d = \sec(-50^\circ)$ ，

試比較 a 、 b 、 c 、 d 大小。

(2) $a = \sin 70^\circ$ 、 $b = \cos 40^\circ$ 、 $c = \cos 10^\circ$ 、


$d = \cot 35^\circ$ ，試比較 a 、 b 、 c 、 d 大小。



自我挑戰



- 求函數 $y = 2\cos 3x - 1$ 之週期和最大、最小值（可利用畫圖）：
週期為 _____、最大值為 _____、最小值為 _____。
- 若 $f(x) = 3\sin 2x$ 的週期為 A ， $g(x) = 5\tan \frac{x}{2}$ 的週期為 B ， $h(x) = |\cos x|$ 的週期為 C ，
則 $A + B + C =$ _____。
- $2\cos^2 \theta + 3\sin \theta = 0$ ，則 $\sin \theta =$ _____。
- 設 $0 \leq x \leq 2\pi$ ，若 $f(x) = \sin^2 x + \cos x - 1$ 的最大值為 a ，最小值為 b ，則 (a, b) 為 _____。
- 下列何者為真？
(A) $\sin 35^\circ > \cos 45^\circ$ 、(B) $\sec 47^\circ > \tan 47^\circ$ 、(C) $\tan 222^\circ > \tan 223^\circ$ 、(D) $\sin 65^\circ < \cos 65^\circ$ 。
_____。
- 以正弦函數圖形模擬六月份旗津沿海潮汐概況，設 $b > 0$ ，
 $y = a \sin(bx) + c$ 圖形如右，求 $a + b + c$ 之值為 _____。



2-6

正弦定理與餘弦定理



重點

正弦定理與餘弦定理


1. 正弦定理：

$\triangle ABC$ 中， $\angle A$ 、 $\angle B$ 、 $\angle C$ 之對邊長分別為 a 、 b 、 c ，

$\triangle ABC$ 之外接圓半徑為 R ，則

$$(1) \frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R。$$

$$(2) a:b:c = \sin A:\sin B:\sin C。$$



NOTE

(a) 正弦定理(1)使用時機：① 對角及其對邊 (Aa 或 Bb 或 Cc) 已知時。
② (R 與角) 或 (R 與邊) 已知時

(b) 正弦定理(2)使用時機：由邊求 $\sin A:\sin B:\sin C$ 或由角求 $a:b:c$ 。

2. 餘弦定理：

$\triangle ABC$ 中， $\angle A$ 、 $\angle B$ 、 $\angle C$ 之對邊長分別為 a 、 b 、 c ，則

$$(1) \begin{cases} a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A \\ b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B \\ c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C \end{cases} \Rightarrow (2) \begin{cases} \cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} \\ \cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} \\ \cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} \end{cases}$$



NOTE

(a) 餘弦定理(1)使用時機：兩邊長及其夾角已知時可求第三邊。

(b) 餘弦定理(2)使用時機：三邊長已知時可求任一角。

難易度

01

老師講解

正弦定理(1)

學生演練



$\triangle ABC$ 中，已知 $\overline{AB} = \sqrt{3}$ 、 $\angle C = 60^\circ$ 、 $\angle B = 45^\circ$ ，試求：(1) $\overline{AC}$ (2) 外接圓半徑 R 。

$\triangle ABC$ 中，已知 $\overline{BC} = 4$ 、 $\angle B = 30^\circ$ 、 $\angle C = 15^\circ$ ，試求：(1) $\overline{AC}$ (2) 外接圓半徑 R 。

難易度 ●●



02 老師講解

正弦定理 (2)

學生演練

若 $\triangle ABC$ 中，三邊長分別為 a 、 b 、 c ，
且 $(a+b):(b+c):(c+a)=5:6:7$ ，
試求 $\sin A:\sin B:\sin C$ 。

若 $\triangle ABC$ 中， $\angle A:\angle B:\angle C=1:1:4$ ，
試求 $a:b:c$ 。

難易度 ●●



03 老師講解

餘弦定理 (1)

學生演練

已知 $\triangle ABC$ 中， $\overline{AB}=3$ 、 $\overline{BC}=5$ 、 $\angle B=120^\circ$ ，
試求 $\overline{AC}$ 長度。

已知 $\triangle ABC$ 中， $\overline{BC}=3$ 、 $\overline{AC}=4$ 、 $\angle C=60^\circ$ ，
試求 $\overline{AB}$ 長度。

難易度 🐾🐾



04 老師講解

餘弦定理 (2)

學生演練

已知 $\triangle ABC$ 中， $a=3$ 、 $b=7$ 、 $c=8$ ，試求：
(1) $\angle B$ (2) $\sec B$ (3) 最小角之餘弦值。

已知 $\triangle ABC$ 中， $a=4$ 、 $b=5$ 、 $c=6$ ，試求：
(1) 最小角之餘弦值 (2) $\sec A$ (3) $\cos B$ 。

難易度 🐾🐾



05 老師講解

餘弦定理應用

學生演練

於 $\triangle ABC$ 中，已知 $a^2 + b^2 = c^2 + \sqrt{3}ab$ ，試求 $\angle C$ 。

於 $\triangle ABC$ 中，已知 $(a-b)^2 - c^2 + 3ab = 0$ ，試求 $\angle C$ 。



補充 解三角形

在 $\triangle ABC$ 中，三個邊 a 、 b 、 c 與三個角 A 、 B 、 C 只要任知其中三項（其中需包含一邊長），即可求得另外三項。求出 $\triangle ABC$ 之三邊三角的過程稱為解 $\triangle ABC$ 。交互使用正餘弦定理雖可解出三角形，但因解題條件不同需多次計算，過程十分繁複，在此我們可以正弦定理 $a:b:c=\sin A:\sin B:\sin C$ 的性質，找出各式之比例關係，即可輕易求算，但**需熟記**

第一、二象限所有特別角的正弦函數值：

$$\sin 30^\circ = \sin 150^\circ = \frac{1}{2}; \quad \sin 45^\circ = \sin 135^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}; \quad \sin 60^\circ = \sin 120^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2};$$

$$\sin 75^\circ = \sin 105^\circ = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}; \quad \sin 15^\circ = \sin 165^\circ = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}.$$

例如 已知 $\triangle ABC$ 中， $a = \sqrt{6}$ 、 $b = \sqrt{3} - 1$ 、 $\angle C = 45^\circ$ ，試求 $\angle A$ 、 $\angle B$ 、 $\overline{AB}$ 。

先列出表格填入已知數據（黑色為已知，藍色為求算過程）：

a	b	c
$\sqrt{6}$	$\sqrt{3} - 1$	2
$\times \sqrt{2}$ $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$	$\sqrt{6} - \sqrt{2}$	$2\sqrt{2}$
$\div 4$ $\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$
$\rightarrow$ sin值		
60°或120°	15°或165°	45°
A	B	C

說明 表中黑色為已知數據，邊在第一列，角在最下列，由第一列 $\times \sqrt{2}$ 再 $\div 4$ 湊出 $\frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$ 、

$\frac{\sqrt{3}}{2}$ 等正弦值，可得 $\angle A = 60^\circ$ 或 120° 、 $\angle B = 15^\circ$ 或 165° 。

再由已知 $\angle C = 45^\circ$ 得正弦值 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ，反向 $\times 4$ 再 $\div \sqrt{2}$ 即可求出邊長 $c = 2$ 。

由 $\triangle ABC$ 大角對大邊性質知 $a > c > b$ ，所以 $\angle A > \angle C > \angle B$ 且 $\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$ ，即可判斷 $\angle A = 120^\circ$ 、 $\angle B = 15^\circ$ 。

難易度 ●●●



06

老師講解

解三角形

學生演練

$\triangle ABC$ 中， $\overline{BC}=2$ 、 $\overline{AC}=\sqrt{2}$ 、 $\overline{AB}=\sqrt{3}-1$ ，
試求 $\angle A$ 、 $\angle B$ 、 $\angle C$ 。

$\triangle ABC$ 中， $a=\sqrt{6}$ 、 $b=2$ 、 $c=\sqrt{3}+1$ ，試求
 $\angle A$ 、 $\angle B$ 、 $\angle C$ 。

難易度 ●●●



07

老師講解

解三角形

學生演練

$\triangle ABC$ 中， $\angle A=60^\circ$ 、 $\overline{AC}=\sqrt{3}+1$ 、 $\overline{AB}=2$ ，
試求 $\overline{BC}$ 、 $\angle B$ 、 $\angle C$ 。

$\triangle ABC$ 中， $\angle A=45^\circ$ 、 $\overline{AC}=\sqrt{2}$ 、 $\angle B=30^\circ$ ，
試求 $\overline{AB}$ 、 $\overline{BC}$ 、 $\angle C$ 。

**重點****三角形面積公式**

三角形面積求算：

$\triangle ABC$ 中 $\angle A$ 、 $\angle B$ 、 $\angle C$ 之對邊長分別為 a 、 b 、 c ， R 為 $\triangle ABC$ 之外接圓半徑， r 為 $\triangle ABC$ 之內切圓半徑， $s = \frac{a+b+c}{2}$ ，則

$$(1) \triangle ABC = \frac{1}{2}ab\sin C = \frac{1}{2}bc\sin A = \frac{1}{2}ac\sin B。$$

$$(2) \triangle ABC = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)} \quad (\text{海龍公式})。$$

$$(3) \triangle ABC = \frac{abc}{4R}。$$

$$(4) \triangle ABC = rs。$$



NOTE ①公式(1)之使用時機：

三角形兩邊長及其夾角已知時。(和餘弦定理(1)相同)

②公式(2)之使用時機：

三角形三邊長已知時。(和餘弦定理(2)相同)

③由註①②知餘弦定理可用之時機，均可求算三角形面積。

④公式(3)(4)多用以由三角形面積反求 R 、 r 。

難易度 🐾🐾

08

老師講解

三角形面積和餘弦定理

學生演練



已知 $\triangle ABC$ 中， $\angle A = 120^\circ$ 、 $b = 1$ 、 $c = 2$ ，試求：

(1) $\triangle ABC$ 面積 (2) $\overline{BC}$ 長。

已知 $\triangle ABC$ 中， $\overline{BC} = 3$ 、 $\overline{AB} = 2$ 、 $\angle B = 60^\circ$ ，試求：

(1) $\triangle ABC$ 面積 (2) $\overline{AC}$ 長。

難易度 🐾🐾



09 老師講解

三角形面積、海龍、 R 、 r

學生演練

若 $\triangle ABC$ 中， $\overline{AB}=3$ 、 $\overline{BC}=6$ 、 $\overline{AC}=7$ ，
試求：

- (1) $\triangle ABC$ 面積 (2) 外接圓半徑 R
(3) 內切圓半徑 r 。

若 $\triangle ABC$ 中， $a=4$ 、 $b=5$ 、 $c=7$ ，試求：

- (1) $\triangle ABC$ 面積 (2) 外接圓半徑 R
(3) 內切圓半徑 r 。

難易度 🐾🐾



10 老師講解

面積公式求分角線長

學生演練

已知 $\triangle ABC$ 中， $\overline{AB}=5$ 、 $\overline{AC}=6$ 、 $\angle A=120^\circ$ ，
 $\angle A$ 平分線交 $\overline{BC}$ 於 D ，試求 $\overline{AD}$ 長度。



已知 $\triangle ABC$ 中， $\overline{AB}=8$ 、 $\overline{BC}=6$ 、 $\angle B=60^\circ$ ，
 $\angle B$ 平分線交 $\overline{AC}$ 於 D ，試求 $\overline{BD}$ 長度。



自我挑戰



1. 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $\angle A = 60^\circ$ ， $\angle B = 75^\circ$ ， $\overline{AB} = 2$ ，則 $\overline{BC}$ 的長度為 _____。
2. $\triangle ABC$ 中， $\overline{AB} = 5$ ， $\overline{AC} = 8$ ， $\angle A = 60^\circ$ ，則 $\overline{BC}$ 的長度為 _____。
3. 若三角形中三邊長比值為 $3:5:7$ ，則最大角為 _____。
4. $\triangle ABC$ 中， $\sin A : \sin B : \sin C = 1 : \sqrt{3} : 2$ ，則 $\sin A + \cos B + \sin C =$ _____。
5. 已知一圓的半徑為 10，則其內接正十二邊形的面積為 _____。
6. $\triangle ABC$ 中， $\overline{AB} = 3$ 、 $\overline{AC} = 4$ 、 $\angle A = 120^\circ$ ，若 $\angle A$ 的內角平分線交 $\overline{BC}$ 於一點 D ，則 $\overline{AD}$ 長度為 _____。
7. 已知四邊形 $ABCD$ 中， $\overline{AB} = 8$ 、 $\overline{BC} = 3$ 、 $\overline{AD} = 5$ ，且 $\angle ABC = \angle ADC = 60^\circ$ ，則 $\overline{CD}$ 之長為 _____。
- 素 8. 一時鐘的時針長度為 3 公分，分針長度為 5 公分，試問從 8:00 到 8:20 時針針尖所移動的弧長為 _____ 公分。
- 素 9. 承上題，若時針針尖與分針針尖的距離為 7 公分，則時針與分針所夾的角度為 _____。
10. 圓內接四邊形 $ABCD$ 如右圖所示，已知 $\angle BAC = 30^\circ$ 、 $\angle ACD = 60^\circ$ 、 $\overline{BC} = 5$ ，試求 $\overline{AD} =$ _____。
11. 已知三角形三邊長 $\overline{AB} = 5$ 、 $\overline{AC} = 3$ 、 $\overline{BC} = 6$ ，如圖
求 $\overline{BC}$ 邊上的高 $\overline{AD} =$ _____。
12. 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $a = 2$ 、 $b = \sqrt{3} + 1$ 、 $\angle C = 60^\circ$ ，則 $\angle A =$ _____、 $\angle B =$ _____、 $\overline{AB} =$ _____。





歷屆試題



- () 1. 若 $180^\circ < \theta < 270^\circ$ 且 $\sin \theta = \sin 2024^\circ$ ，則 $\theta = ?$

(A) 204° (B) 214° (C) 224° (D) 234° 。






【113(C)，答對率 69%】

- () 2. 已知 $\sin \theta \tan \theta < 0$ 且 $\cos \theta \cot \theta > 0$ ，則 θ 為第幾象限角？

(A)一 (B)二 (C)三 (D)四。


【113(C)，答對率 51%】

- () 3. 有一個在水平地面上的圓形輪子，其半徑為 1 單位長。輪子上 A 點與地面接觸，如右圖所示，當輪子向右滾動，相對於圓心 O 而言， A 點以順時針轉動 θ 角，且輪子中心 O 前進 x 單位長的時候， A 點距離地面的高度為 y 單位長。在坐標平面上，若在 $0 \leq x \leq 2\pi$ 的範圍中， y 可以表示為 x 的函數 $f(x)$ ，則下列圖形何者為 $y = f(x)$ 的圖形？



【113(C)，答對率 43%】

- () 4. 有一款可調節角度的倒 V 型平板架，放置於平坦的桌面上，如示意圖所示。若 $\overline{EA} = \overline{ED} = 25 \text{ cm}$ 、 $\overline{AB} = \overline{CD} = 18 \text{ cm}$ 且 $\angle AED = 120^\circ$ ，則長方形 $ABCD$ 面積之值最接近下列哪一個選項（支柱厚度忽略不計）？



(A) 450 cm^2 (B) $450\sqrt{2} \text{ cm}^2$
(C) $450\sqrt{3} \text{ cm}^2$ (D) 900 cm^2 。

【112(B)，答對率 46%】

- () 5. 阿青想了解港口 A 及港口 B 的潮汐變化，於某日凌晨 12 點整開始，經歷 t 小時後，測量港口 A 跟港口 B 的各特定點水深變化 y (單位：公尺)，分別得到了：
- 港口 A : $y = 4\sin(\frac{2\pi}{11}t) + 16, t \geq 0$

港口 B : $y = -5\cos(\frac{2\pi}{13}t) + 17, t \geq 0$


若滿潮代表水深升到最高以及乾潮代表水深降到最低，根據上述兩個函數，下列敘述何者正確？

- (A) 港口 A 的滿潮高度為 20 公尺 (B) 港口 A 的乾潮高度為 16 公尺
(C) 港口 B 的滿潮高度為 17 公尺 (D) 港口 B 的乾潮高度為 13 公尺。

【112(B)，答對率 24%】

- () 6. 在 $\triangle ABC$ 中， $\angle B = 90^\circ$ ，如圖所示，且 $\overline{AC} = 3$ 、 $\overline{BC} = 2$ ，則 $\tan A = ?$


- (A) $\frac{3}{\sqrt{5}}$ (B) $\frac{2}{\sqrt{5}}$ (C) $\frac{1}{\sqrt{5}}$ (D) $\frac{1}{3\sqrt{5}}$ 。



【112(C)，答對率 62%】


- () 7. 已知 $\triangle ABC$ 三邊長分別為 $\overline{AB} = 7$ ， $\overline{BC} = 3$ ， $\overline{CA} = 5$ ，如圖所示，試求 $\overline{BC}$ 邊上的高 $\overline{AD} = ?$

- (A) $\frac{5\sqrt{3}}{4}$ (B) $\frac{4\sqrt{3}}{3}$ (C) $\frac{5\sqrt{3}}{3}$ (D) $\frac{5\sqrt{3}}{2}$ 。



【112(C)，答對率 44%】

- () 8. 假設風力發電的風車旋轉軸平行於地面，且有三葉片，T 點為某葉片的頂端，如圖所示，我們想了解 T 點在風車旋轉過程中距離地面的高度變化。已知風車逆時針方向等速旋轉一圈需時 4 秒，且每個葉片長度皆為 40 公尺，其旋轉中心離地面 70 公尺。若風車開始運轉時，T 點恰在離地面最高的位置上，且 x 秒後可用 $f(x) = 40\sin(ax + \frac{\pi}{2}) + 70$



(其中常數 $a > 0$ 且 $0 \leq x \leq 4$) 來描述 T 點離地面的高度(單位：公尺)，則 a 可為下列何者？

- (A) $\frac{\pi}{3}$ (B) $\frac{\pi}{2}$ (C) π (D) $\frac{4\pi}{3}$ 。


【112(C)，答對率 34%】

- () 9. 下列何者錯誤？

- (A) $y = |\sin 2x|$ 之週期為 $\frac{\pi}{2}$ (B) $y = 3\sin x$ 之週期為 2π

- (C) $y = \cos 2x$ 之週期為 $\frac{\pi}{2}$ (D) $y = 4\cos x$ 之週期為 2π 。【111(C)，答對率 41%】

- () 10. 若 $\triangle ABC$ 三邊長為 4、5、6，則其外接圓直徑為何？
 (A) $\frac{8}{\sqrt{7}}$ (B) $\frac{12}{\sqrt{7}}$ (C) $\frac{16}{\sqrt{7}}$ (D) $\frac{20}{\sqrt{7}}$ 。 【111(C)，答對率 36%】
- () 11. 已知 $\triangle ABC$ 的面積為 $\frac{3\sqrt{2}}{2}$ ，其中 $\overline{AB}=3$ 、 $\overline{AC}=2$ ，且 $\angle BAC$ 為鈍角。若 $\overline{BC}$ 的長度為 a ，則 $a^2 = ?$
 (A) $13-6\sqrt{2}$ (B) $13-2\sqrt{6}$ (C) $13+2\sqrt{6}$ (D) $13+6\sqrt{2}$ 。 【111(C)，答對率 29%】
- () 12. 若 $\tan \theta + \sec \theta = 5$ ，則 $\tan \theta - \sec \theta = ?$
 (A) $-\frac{3}{5}$ (B) $-\frac{1}{5}$ (C) $\frac{1}{5}$ (D) $\frac{3}{5}$ 。 【110(C)，答對率 38%】
- () 13. 若下列四選項中，其中有三個互為同界角，則下列何者不是另外三個選項的同界角？
 (A) $-\frac{9\pi}{5}$ (B) -36° (C) $\frac{\pi}{5}$ (D) 1116° 【110(B)，答對率 47%】
- () 14. 已知 $\tan \theta = \frac{7}{25}$ 。若 $\sin \theta \cos \theta = a$ ，則下列何者正確？
 (A) $\frac{1}{2} < a < 1$ (B) $0 < a < \frac{1}{2}$ (C) $-\frac{1}{2} < a < 0$ (D) $-1 < a < -\frac{1}{2}$ 。 【110(B)，答對率 43%】
- () 15. 下列敘述何者正確？
 (A) $y = \tan \frac{\theta}{3}$ 的週期為 $\frac{\pi}{3}$ (B) $\tan^2 \theta - \sec^2 \theta = 1$ (C) $-\sqrt{2} \leq \sin \theta + \cos \theta \leq \sqrt{2}$
 (D) 若 $\cos \theta = \sin \theta$ ，則 $\theta = \frac{\pi}{4} + 2n\pi$ ，其中 n 為整數。 【110(C)，答對率 40%】
- () 16. 若 θ 為第二象限角，且 $\sin \theta = \frac{\sqrt{7}}{4}$ ，則 $\cos \theta = ?$
 (A) $\frac{-3}{4}$ (B) $\frac{-\sqrt{5}}{4}$ (C) $\frac{\sqrt{5}}{4}$ (D) $\frac{3}{4}$ 。 【109(B)，答對率 48%】
- () 17. 若 $a = \tan 480^\circ$ ， $b = \sec 135^\circ$ ， $c = \cos(-60^\circ)$ ，則下列有序數對何者在第二象限？
 (A) (b, c) (B) (a, b) (C) (c, a) (D) (c, b) 。 【109(C)，答對率 42%】
- () 18. 設函數 $f(x) = 2\cos 3x - 1, x \in [0, 2\pi]$ ，若其圖形和 x 軸的交點個數與函數的最大值分別為 a 、 b ，則 $ab = ?$
 (A) 6 (B) 9 (C) 12 (D) 18 。 【109(C)，答對率 27%】
- () 19. 在 $\triangle ABC$ 中，若 $\angle A$ 之內角平分線交 $\overline{BC}$ 於 D ，其中 $\overline{AB}=3$ 、 $\overline{AC}=6$ ，且 $\angle A=120^\circ$ ，如右圖，則 $\overline{CD} = ?$
 (A) $\sqrt{26}$ (B) $3\sqrt{3}$ (C) $2\sqrt{7}$ (D) $\sqrt{7}$ 。 【109(C)，答對率 42%】



- () 20. 假設分針原始指在時鐘 12 的位置，現將分針依順時針的方向旋轉了 2019° 。試問下列敘述何者正確？
 (A) 分針指在 9 跟 10 之間 (B) 分針指在 7 跟 8 之間
 (C) 分針指在 5 跟 6 之間 (D) 分針指在 3 跟 4 之間。【108(B)，答對率 66%】
- () 21. 當角度 θ 由 15° 上升至 75° 時，關於 $\tan \theta$ 之值的變化，下列敘述何者正確？
 (A) 一直上升 (B) 一直下降
 (C) 先上升後下降 (D) 先下降後上升。【108(B)，答對率 44%】
- () 22. 若 $a = \sin \theta$ ，則下列敘述何者恆為正確？
 (A) $\sin(\theta + 90^\circ) = a$ (B) $\cos(\theta + 90^\circ) = a$
 (C) $\sin(\theta + 180^\circ) = -a$ (D) $\cos(\theta + 180^\circ) = -a$ 。【108(B)，答對率 39%】
- () 23. 若點 $P(x, y)$ 為有向角 θ 終邊上一點且 $xy \neq 0$ ，則下列何者正確？
 (A) $x \sin \theta > 0$ (B) $y \cos \theta > 0$ (C) $x \cot \theta > 0$ (D) $y \csc \theta > 0$ 。
 【108(C)，答對率 28%】
- () 24. 已知扇形的面積為 1 且其周長為 5，試問此扇形的半徑為何？
 (A) $\frac{2}{5}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) 1 (D) 2。【108(C)，答對率 39%】
- () 25. 有一梯子斜於牆上，且梯子、地面及牆面構成一個 30° 、 60° 、 90° 的直角三角形。若梯子沿牆面下滑 $\frac{1}{2}$ 公尺時，則梯子、地面及牆面構成一個 45° 、 45° 、 90° 的直角三角形。試問梯長為多少公尺？
 (A) $\frac{\sqrt{3} + \sqrt{2}}{2}$ (B) $\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{2}$ (C) $\sqrt{3} + \sqrt{2}$ (D) $\sqrt{6} + \sqrt{2}$ 。【108(C)，答對率 30%】
- () 26. 若 $\sin \theta = \frac{33}{65}$ ，且 $\tan \theta = -\frac{33}{56}$ ，則 θ 為哪一象限角？
 (A) 第一象限角 (B) 第二象限角 (C) 第三象限角 (D) 第四象限角。
 【107(B)，答對率 57%】
- () 27. 若 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ ，且 $\sin \theta = \frac{3}{5}$ ，則 $\tan \theta + \sec \theta = ?$
 (A) $\frac{12}{35}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) 2 (D) $\frac{35}{12}$ 。【107(B)，答對率 55%】
- () 28. 若 $\tan \theta = \frac{8}{15}$ ，則 $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta + \sec^2 \theta = ?$
 (A) $\frac{514}{225}$ (B) $\frac{38}{15}$ (C) $\frac{64}{225}$ (D) $\frac{49}{625}$ 。【107(B)，答對率 40%】

- () 29. $\cos 0^\circ + \cos 10^\circ + \cos 20^\circ + \cos 30^\circ + \cdots + \cos 350^\circ + \cos 360^\circ = ?$
 (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 。 【107(C)，答對率 39%】
- () 30. 設三角形三邊長分別為 5、6、7，若三角形面積為 A ，內切圓半徑為 r ，則 $A \times r = ?$
 (A) 24 (B) 35 (C) 105 (D) 210 。 【107(C)，答對率 50%】
- () 31. 設三角形的三邊長為 7、24、25，其內切圓半徑為 r ，外接圓半徑為 R ，求 $\frac{r}{R} = ?$
 (A) 0.12 (B) 0.24 (C) 0.25 (D) 0.48 。 【106(C)，答對率 44%】
- () 32. 求 $\sin^2 18^\circ + \sin^2 36^\circ + \sin^2 54^\circ + \sin^2 72^\circ + \sin^2 90^\circ = ?$
 (A) 2 (B) 2.5 (C) 3 (D) 3.5 。 【106(C)，答對率 62%】
- () 33. 若 $\tan \theta \csc \theta = -1 + 6 \cos \theta$ ，其中 θ 為第三象限角，則 $\tan \theta = ?$
 (A) $2\sqrt{2}$ (B) $\sqrt{3}$ (C) $-\sqrt{3}$ (D) $-2\sqrt{2}$ 。 【106(C)，答對率 34%】